



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA**



GUÍA ACTUALIZADA DE LAS **AVES ENDÉMICAS Y CASI ENDÉMICAS** DEL MAGDALENA

Un tesoro alado para proteger
en nuestro departamento

Gualberto Naranjo Maury
Antonio Ayala Viloria
Francisco Troncoso
Julieth Prieto Rodríguez
Jose David Morales De La Cruz

CORPAMAG
- 2026 -

PROLOGO

El departamento del Magdalena alberga uno de los patrimonios naturales más extraordinarios de Colombia y del mundo. En su territorio convergen ecosistemas que van desde los manglares, bosques secos y humedales del Caribe hasta los bosques nublados y páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del planeta. Este excepcional gradiente altitudinal, que asciende desde el nivel del mar hasta los 5.775 metros de altitud en menos de 50 kilómetros en línea recta, ha favorecido procesos evolutivos únicos que han dado origen a una biodiversidad de incalculable valor.

Dentro de este mosaico de ecosistemas, la Sierra Nevada de Santa Marta ocupa un lugar privilegiado como el principal centro de endemismo de Colombia y uno de los más importantes del Neotrópico. Su prolongado aislamiento geográfico respecto a la cordillera de los Andes permitió que numerosas especies evolucionaran de manera independiente durante millones de años, originando una avifauna exclusiva que no existe en ningún otro lugar del planeta. Este fenómeno convierte a la Sierra Nevada en un laboratorio natural de evolución y en una prioridad mundial para la conservación de la biodiversidad.

Las aves representan una de las expresiones más notables de esta singularidad biológica. Decenas de especies endémicas y casi endémicas encuentran aquí su único refugio o mantienen poblaciones fundamentales para su supervivencia. Muchas de ellas ocupan rangos de distribución muy restringidos, asociados a determinados pisos altitudinales o tipos de bosque, lo que las hace especialmente sensibles a las transformaciones del paisaje y al cambio climático. Su presencia no solo refleja la riqueza ecológica del territorio, sino también la responsabilidad que tiene la sociedad en garantizar su conservación.

Sin embargo, a pesar de los importantes avances en el conocimiento de la avifauna regional, aún persisten vacíos sobre la distribución, ecología y estado de conservación de muchas especies. La pérdida y fragmentación del hábitat, el cambio en el uso del suelo y otras presiones de origen antrópico representan desafíos crecientes que hacen indispensable fortalecer la investigación, el monitoreo y las estrategias de conservación.

Esta Guía de las Aves Endémicas y Casi Endémicas del Magdalena nace como una herramienta para acercar este conocimiento a observadores de aves, investigadores, estudiantes, guías de naturaleza, comunidades locales y visitantes interesados en descubrir la riqueza biológica del departamento.

Más que un compendio de especies, esta obra busca promover el reconocimiento del extraordinario valor ecológico de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Magdalena, incentivar su apreciación y contribuir a la conservación de uno de los patrimonios naturales más excepcionales de Colombia.

Alfredo Rafael Martínez Gutiérrez,
Director General
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

AVES ENDÉMICAS Y CASI ENDÉMICAS DEL MAGDALENA.

Santa Marta, Magdalena, 2026

Gualberto Naranjo Maury
walycol@gmail.com

Antonio José Viloría Ayala
antonioayalaviloria@gmail.com

Julieth Prieto Rodríguez
julietha.marina@gmail.com

Francisco Troncoso
froncoso48@gmail.com

José David Morales De la Cruz
moralesdelacruzj@gmail.com

Fotografías

Gualberto Naranjo Maury

con excepción de:

Chrysuronia Lilliae: Omar Gutierrez

Rhamphomicron dorsale: Tony Cala

Oxypogon cyanolaemus: Tony Cala

Nonnula frontalis : Jorge Gabriel Campos

Nystalus radiatus : Rodrigo Gaviria

ISBN, XXXXXXXXXXXXXXXX

Naranjo Maury, G., Ayala Viloría, A. J., Prieto Rodríguez, J., Troncoso, F., & Morales De la Cruz, J. D. (2026). Aves endémicas y casi endémicas del Magdalena.

INTRODUCCION

“Conservando generamos más oportunidades”

En la última década, el aviturismo ha emergido como una de las expresiones más relevantes del ecoturismo en Colombia, consolidando al país como un referente mundial en la observación de aves. Este crecimiento se sustenta en la extraordinaria diversidad avifaunística del territorio nacional, considerada la más alta del planeta, y en el creciente interés científico y recreativo por su estudio y apreciación.

En este contexto, el departamento del Magdalena se destaca como un escenario privilegiado, resultado de su posición geográfica estratégica y de la presencia de ecosistemas de alta singularidad biológica, entre los que sobresale la Sierra Nevada de Santa Marta, reconocida como uno de los principales centros de endemismo del Neotrópico.

La compleja gradiente altitudinal y la heterogeneidad ecológica del Magdalena han favorecido el establecimiento de una elevada riqueza de especies, incluyendo un conjunto considerable de aves endémicas y casi endémicas poseyendo el 35% de las especies endémicas de Colombia. Estas especies, altamente valoradas por la comunidad ornitológica y por observadores nacionales e internacionales, constituyen el núcleo del atractivo aviturístico regional. Las especies endémicas, de distribución restringida y confinadas principalmente a la Sierra Nevada de Santa Marta, presentan adaptaciones evolutivas estrechamente vinculadas a las condiciones ambientales locales. Por su parte, las casi endémicas, aunque comparten parte de su rango de distribución con regiones adyacentes del Caribe continental, mantienen en el Magdalena poblaciones clave para su conservación, lo que incrementa su relevancia biogeográfica, científica y turística.

Dada la importancia de este componente avifaunístico en la configuración del patrimonio natural del departamento y su papel como base del potencial ecoturístico y económico asociado al aviturismo, resulta imperativo garantizar su conservación a largo plazo. Sin embargo, factores como la pérdida y fragmentación del hábitat, el cambio en el uso del suelo, la expansión de la frontera agropecuaria y otras presiones antrópicas representan amenazas críticas para la integridad de estas poblaciones. En consecuencia, se hace necesario fortalecer las estrategias de investigación, monitoreo y gestión ambiental, orientadas a asegurar la sostenibilidad ecológica y socioeconómica de las especies endémicas y casi endémicas del Magdalena. Las aves representan uno de los grupos de animales más variados y atractivos del planeta. Desempeñan funciones esenciales dentro de numerosos procesos ecológicos y, por ello, se consideran indicadores valiosos del estado o transformación de los hábitats. Gracias a esta combinación de atributos, resultan ideales para impulsar proyectos de investigación, inversión y de apropiación social de la biodiversidad, orientados a fortalecer la conexión entre las personas y la naturaleza.

Para un departamento como el Magdalena que tiene entre sus apuestas el turismo de naturaleza, son además un gran insumo debido a que tenemos dentro de sus límites el mayor centro de endemismo del país, La Sierra Nevada, y también muchas otras aves que solo es posible verlas en la parte norte de Suramérica, aunque las compartimos con otros países vecinos. Sin embargo, el conocimiento sobre su distribución, comportamiento y dinámica poblacional aún presenta grandes vacíos, especialmente en el caso de las especies que habitan regiones tropicales y de alta diversidad biológica, como Colombia.

Esperamos que cada página de esta guía inspire a mirar con mayor atención los bosques, montañas y paisajes del Magdalena; a comprender que cada especie aquí presentada es el resultado de una historia evolutiva irrepetible y que su permanencia dependerá del compromiso colectivo con la conservación. Proteger las aves endémicas y casi endémicas del Magdalena es preservar una parte irremplazable del patrimonio natural de Colombia y del mundo.

OBJETIVOS DE LA GUÍA

Esta guía tiene como objetivo facilitar la identificación, el conocimiento y la interpretación de las aves endémicas y casi endémicas presentes en el departamento del Magdalena, mediante información accesible y técnicamente fundamentada sobre sus características, distribución y aspectos ecológicos.

Asimismo, busca contribuir al reconocimiento del valor biológico y biogeográfico de estas especies, promoviendo su conservación y fortaleciendo la apropiación del patrimonio natural del territorio. La guía pretende servir como una herramienta de consulta para observadores de aves, guías de naturaleza, comunidades locales, estudiantes, investigadores y visitantes, apoyando procesos de educación ambiental, aviturismo responsable y generación de conocimiento sobre la avifauna del Magdalena.

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA



1. Nombre científico.
2. Nombre común.
3. Nombre en inglés.
4. Foto
5. Familia.
6. Categoría UICN.
7. Dieta preferida
8. Hábitat común.
9. Endemismo.
10. Descripción e identificación.
11. Observaciones observadores
12. Mapa de distribución.
13. Abundancia o frecuencia de registros.
14. Rango altitudinal.

CATEGORIAS UICN
LC – Preocupación Menor
NT – Casi Amenazada
VU – Vulnerable
EN – En Peligro
CR – En Peligro Crítico

QUÉ ES UNA ESPECIE ENDÉMICA Y CASI ENDÉMICA

Endémica: especie cuya distribución natural está restringida a un territorio geográfico determinado en este caso Colombia

Casi endémica: especie cuya distribución se concentra principalmente en Colombia, aunque una parte limitada de su rango se extiende hacia países vecinos.

Establecer cuál es el listado de las aves endémicas y casi endémicas del departamento, tiene que ver con ese potencial que, aprovechado adecuadamente, permitirá que la afluencia de observadores de aves permanezca en el tiempo, y sea un recurso valorado y por ende importantísimo de conservar, convirtiéndose además en especies sombrilla que pueden acoger muchos otros organismos que requieren esfuerzos de conservación y que ocupan las mismas áreas.

Pero uno de los problemas potenciales que se genera cada vez que hablamos de listados de especies de animales es la incongruencia taxonómica; uno esperaría que organismos como las aves con avanzados estudios, ya hubieran resuelto este tipo de inconsistencias que persisten en los diferentes clados. Sin embargo, siguen existiendo debido a diferentes problemas.(Echeverry-Galvis et al., 2022)

Con el propósito de solucionarlo en las aves desde hace unos años, se han reunido un grupo de los taxónomos más renombrados y que gestiona los listados más utilizados en este mundo, y han generado una iniciativa para resolver este problema creando una sola base de datos de referencia para las aves del mundo. esa iniciativa se llama AVILIST y se publicó en junio de 2025, con una actualización para junio de 2026, que hemos acogido.

Ese es el listado que utilizaremos para definir las especies de aves endémicas y casi endémicas que tiene el departamento, con el cual una vez establecido y de acuerdo a las características de cada especie, del listado inicial y gracias a la información que hoy en día tenemos y que para varias especies se ha encontrado de presencia, y poblaciones importantes en mas de tres países, se determino del listado excluir las siguientes especies que aparecían como casi endémicas en el listado de partida.

Cyanocorax affinis: Muchos registros y población en mas de 4 países

Todirostrum nigriceps: Muchos registros y población en mas de 4 países

Cypseloides cherriei: Muchos registros y población en mas de 3 países

Myiornis atricapillus: Un solo registro histórico sin evidencia adicional

Pachyramphus homochrous: Muchos registros y población en mas de 3 países

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Chauna chavari Chavarri

Familia: Anhimidae

UICN: **LC**

Dieta: Herbívoro

Habitat: Humedales y pastizales
alrededor de cuerpos de agua

Northern Screamer

Descripción

Alcanza entre 84 y 94 cm de longitud y un peso cercano a los 4 kg. No existe dimorfismo sexual evidente, ya que machos y hembras presentan un aspecto similar. Posee la corona gris y una cresta conspicua formada por plumas puntiagudas que pueden medir hasta 4 cm, muestra dos parches blancos debajo de sus alas al volar. Patas pesadas y grandes pies sin membranas con los que caminan sobre la vegetación flotante. También tiene espolones afilados que se encuentran en los pliegues del ala.

Comentarios de Observadores

"Con una amplia distribución en el departamento sin embargo su presencia siempre estará asociada a zonas de humedal, es un animal que no se aleja mucho de su zona, una vez que lo has encontrado es muy posible que cuando vuelvas a la zona este allí. Le gustan las ramas altas de los árboles al costado de los humedales y las zonas de juncos y plantas acuáticas altas



Mapa distribución Magdalena



Frecuente

0-200 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Crax alberti

Paujil de pico azul

Familia: Cracidae

UICN: **CR**

Dieta: Semillero

Habitat: Bosques Tierras bajas

Blue-billed Curassow

Descripción


Alcanza una longitud promedio cercana a los 91 cm. Su plumaje es predominantemente negro con brillo, contrastando con el abdomen y el extremo de la cola, que son blancos en el macho destacan las carúnculas y la cera de tonalidad azul sobre el pico. La hembra no tiene protuberancia pero si la cera azul, tiene el bajo vientre de color rojizo. Se han registrado en zonas altas ("2800 m.s.n.m") posiblemente debido a una migración entre cuencas.

Comentarios de Observadores

"Si bien pasa buena parte de su tiempo en el piso, es muy normal encontrarlos en árboles grandes desplazándose, su canto y su "Pujo", ayudan a ubicarlos, aunque son muy asustadizos. Fáciles de ver en el parque Tayrona, los guías conocen muy bien su ubicación.



Mapa distribución Magdalena



Escaso

0-1800 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Ortalis garrula

Guacharaca caribeña

Familia: Cracidae

UICN: **LC**

Dieta: Frugivoro

Habitat: Bosques de tierras bajas
y bosque seco

Rufous-vented Chachalaca

Comun

0-500 M.S.N.M

Descripción

Ave similar a una gallina mediana (aprox. 50–58 cm), de aspecto alargado, cola larga y graduada. Presenta plumaje general pardo oliváceo uniforme con tono algo más claro en garganta y pecho. La cabeza es pequeña, con piel desnuda rojiza en la garganta. La combinación de cabeza rojiza, primarias castañas y puntas pálidas en las rectrices externas es única.

Comentarios de Observadores

“Pava o guacharaca de tierras bajas, es fácil de ubicar cuando se escucha su canto característico en horas de la tarde o la mañana. Esta distribuida por todo el departamento, pero circunscrita a zonas de buena cobertura arbustiva o boscosa en la tierras bajas, en las tardes gusta de percharse de media altura al dosel para pernoctar.



Mapa distribución Magdalena



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Odontophorus atrifrons

Perdiz frentinegra

Familia: Odontophoridae

UICN: **LC**

Dieta: Semillero

Habitat: Bosques medios y altos

Black-fronted Wood-Quail

Escaso

1200-3100 M.S.N.M

Descripción

Codorniz forestal robusta (24–28 cm), terrestre y discreta. Presenta frente negra característica contrastando con la cara castaña y garganta clara. Dorso pardo oscuro con patrón escamado fino; pecho grisáceo a castaño con moteado oscuro. Flancos barrados. Restringida al noreste de Colombia y al adyacente oeste de Venezuela, donde sólo se conoce en la Sierra de Perijá. Hembra mas rojiza en las partes inferiores traseras.

Comentarios de Observadores

“Esta codorniz es muy vocal en las mañanas y difícil de ver por lo asustadiza, pero es visitante recurrente de los diferentes compostaderos creados muchas veces para que estos animales los visiten en la mañana, en la floresta caminan en grupo entre los arbustos.



Mapa distribución Magdalena



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Coccyzua pumila Cuculillo enano

Familia: Cuculidae

UICN **LC**

Dieta: Insectivoro

Habitat: Zonas bajas arbustivas

Dwarf Cuckoo

Descripción

21 cm; 36 g. Adulto gris parduzco por encima con cola corta, gris parduzco con banda subterminal negra, punta blanca; garganta y pecho rufo fusionándose a beige en flancos, abdomen blanco o beige; anillo ocular rojo, iris rojo, pico negro. Característico de Colombia y Venezuela. Esta especie no es parásita de crías, sino que construye una endeble plataforma de palos en un árbol pequeño.

Comentarios de Observadores

"Este cuco tiene su mayor cantidad de registros en Colombia y Venezuela con registros en Panama y algunos muy puntuales en Ecuador.

En el Magdalena es frecuente asociarlo a zonas bajas de arbustos de buen porte y manglar adyacentes a cuerpos de agua.

Mapa distribucion Magdalena



Frecuente

0 - 1200 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Megascops gilesi Autillo de Santa Marta

Familia: Strigidae

UICN **VU**

Dieta: Carnivoro

Habitat: Bosques maduros

Santa Marta screech Owl


Descripción

Búho pequeño endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta (aprox. 20–23 cm). Con 2 morfos, gris y amarillo rojizo, de tamaño mediano y ojos amarillos. Presenta penachos auriculares cortos y prominentes. Presenta disco facial poco definido con borde marrón oscuro, corona y dorso barrados, y un collar nuchal pálido parcialmente oculto, separado del manto por una banda oscura. Las partes inferiores muestran estrías axiales escasas y barras ventrales pálidas, rectas y ampliamente espaciadas. Los tarsos están emplumados de tono beige dorado, mientras que los dedos permanecen desnudos.

Comentarios de Observadores

"Fácil detectar su presencia por su estridente canto; es un búho que le gusta vivir en el bosque primario denso donde se camufla bastante bien, aunque falta información de cuál es el estrato que prefiere para su percha diurna. Usar las nuevas tecnologías con equipos de visión nocturna que hacen más fácil su ubicación sin perturbarlo demasiado para observarlo."

Mapa distribucion Magdalena



Escaso

1800 A 3000 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Anthocephala floriceps *Colibrí coronado de Santa Marta*

Familia: Trochilidae

UICN: **VU**

Dieta: Nectarívoro

Habitat: Sotobosque del bosque
montano Humedo

Santa Marta Blossomcrown

Escaso

600 - 2500 M.S.N.M

Descripción


Presenta una longitud aproximada de 8,4 cm, con un pico relativamente corto que alcanza cerca de 13 mm. En cuanto al dimorfismo sexual, el macho exhibe una corona de tono castaño rojizo intenso (rufo), mientras que en la hembra esta área es más bien castaña, La garganta es color crema en ambos, la cola . cuadrada, verde bronceada, con la punta de color ante pálido, el juveniles similar a la hembra.

Comentarios de Observadores

"Se debe buscar las flores de tipo verbenaceas y algunas otra bromelias de pequeño tamaño que son su alimento natural. En su rango de distribución altitudinal donde se concentran. Una muy buena forma de observarlo es localizar flores de tipo verbenacea y esperarlo con paciencia."



Mapa distribución Magdalena



ENDEMICO



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Campylopterus falcatus *Ala de sable pecho azul*

Familia: Trochilidae

UICN: **LC**

Dieta: Nectarívoro

Habitat: Bosque semicaducifolio montano alto y bajo

Lazuline Sabrewing

Frecuente

900 A 3000 M.S.N.M

Descripción


Alcanza aproximadamente 13 cm de longitud. El macho presenta un pico negro ligeramente curvado hacia abajo. El plumaje de las partes superiores es de un verde esmeralda brillante, acompañado por una mancha blanca detrás del ojo y una cara negra bien definida y cola rufa. Pecho y garganta azul intenso. Prefiere visitar flores en zonas sombreadas o cubiertas de bosques montanos semicaducifolios, bordes de bosques, jardines, zonas perturbadas y subpáramo.

Comentarios de Observadores

"Es un colibrí territorial que puede ser ubicado en la zona media de la sierra nevada vinculado a zonas de flores de abutilones bromelias y heliconias, una vez registrado en el area se siguen encontrando facilmente, su mayor población esta en los andes colombianos, pero lo compartimos con Ecuador y Venezuela:"



Mapa distribución Magdalena



CASI ENDEMICA



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Campylopterus phainopeplus
Ala de sable de Santa Marta



Santa Marta Sabrewing

Raro

1000 - 2000 M.S.N.M

Descripción

ENDEMICO

13 cm. El macho tiene el pico negro ligeramente decurvado; partes superiores verde esmeralda brillante, mancha postocular blanca, cara negra; garganta y pecho azul iridiscente, resto de las partes inferiores verde oscuro, ejes de las tres primarias externa mas claros. En la hembra la parte inferior es de color gris con los flancos y en las coberteras de la cola verdes; la cola tiene un color verde grisáceo con algunas manchas; y la corona y las mejillas son un poco más apagadas que en el macho.

Comentarios de Observadores

Mapa distribucion Magdalena

“En el Magdalena solo conocido de registros ocasionales en la misma zona arriba de Minca. Es mas comun en la zona de Atanquez en el Cesar. Tener cuidado de no confundir la hembra con la de Chalybura buffoni, Zonas de abutilones y Heliconias



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Chrysuronia lilliae
Colibrí Manglero



Sapphire-bellied Hummingbird

Escaso

0 - 200 M.S.N.M

Descripción

ENDEMICO

El macho mide entre 8,9 y 9,4 cm de longitud y presenta un peso aproximado de 4,3 g. Posee un pico recto de cerca de 1,8 cm, con la maxila negra y la mandíbula inferior rosada rematada por una punta oscura. La frente, la corona, y la nuca muestran verde azulado, y el pecho azulado fuertemente. Su mayor cantidad de registros estan en la zona del Parque isla de Salamanca, pero puntualmente tambien se le ha registrado en bahias con Manglar del parque Tayrona.

Comentarios de Observadores

Mapa distribucion Magdalena

“Un colibrí de los llamados ruteros, establece un recorrido por la zona donde tiene su territorio visitando las pequeñas flores de las que se alimenta varias veces al día. Fuertemente vinculado a las zonas de manglar y a las zonas arbustivas cercanas a áreas de humedales costeros.”



 **OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA**
NUESTRAS AVES ENDÉMICAS 

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Chaetocercus astreans Rumbito de Santa Marta

- Familia: Trochilidae
- UICN: **LC**
- Dieta: Nectarivoro
- Habitat: Bordes bosque montano

Santa Marta Woodstar


Descripción

7 cm. El macho presenta pico recto de color negro; la cabeza es de un verde intenso y brillante, mientras que el resto del dorso exhibe un tono azul oscuro iridiscente. Destaca una gorguera rojiza, alargada, que forma conspicuos penachos a manera de "orejitas". La hembra es de color verde bronceado en la parte superior y canela rojizo pálido en la inferior, con una mancha oscura en la mejilla y, al igual que el macho, una mancha blanca en los flancos. Su cola redondeada tiene plumas centrales verdes y el resto son de color canela con una franja negra cerca del extremo.

Comentarios de Observadores

"Una de las especies de colibrí con mayor rango altitudinal de distribución, desde la playa hasta los 2200 metros, inconfundible por su pequeño tamaño, pero debe distinguirse de mulsant, que tiene registros en la sierra en la zona frente al perija, hace migraciones altitudinales, y es posible en diferentes altitudes encontrar separación entre los sexos."

Mapa distribución Magdalena



Frecuente

0 - 1800 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Oxypogon cyanolaemus Chivito de Santa Marta

- Familia: Trochilidae
- UICN: **EN**
- Dieta: Nectarivoro
- Habitat: Paramo

Blue-bearded Helmetcrest

Descripción

Es uno de los colibríes más raros y amenazados del mundo, encontrado solamente a elevaciones extremadamente altas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. No se lo encuentra normalmente en áreas accesibles o visitadas por observadores de aves. Para observarlo se requiere organizar una expedición con campamento de varios días en terrenos muy escarpados. El macho posee distintivos "babero" verde-azul, patrón de cabeza blanco y negro y cresta enmarañada. La hembra y el juvenil carecen de la cresta y del "babero" y pueden reconocerse por su tamaño, pico corto y cuello blanco.

Comentarios de Observadores

"En las localidades de su área de distribución hay que buscar el retamo de paramo y los frailejones donde suele libar y establecer su territorio. Se alimenta en arbustos florecientes en y alrededor de pastizales de alta elevación; a menudo se agarra a las flores de las cuales se alimenta."

Mapa distribución Magdalena



Escaso

3000 - 4800 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Chlorostilbon gibsoni *Esmeralda piqui roja*

Familia: Trochilidae

UICN: **LC**

Dieta: Nectarivoro

Habitat: Zonas Bajas arbustivas

Red-billed Emerald

Descripción

Longitud entre 7 y 9 cm y peso de 2 a 8 g. Presenta un pico recto; en el macho la mandíbula inferior es predominantemente roja, mientras que en la hembra el color rojo se restringe a la base.


El macho adulto exhibe el dorso de color verde bronce oscuro, con la corona carente de iridiscencia. Los lados de la cabeza y las partes inferiores muestran un brillo que varía de verde intenso a verde dorado. La cola es profundamente ahorquillada y de tonalidad azul negruzca con reflejos acerados.

La hembra es muy similar en apariencia a la de *Chlorostilbon mellisugus*, por lo que resulta difícil diferenciarla en campo.

Comentarios de Observadores

“Fuertemente asociado a zonas de bosque seco y estribaciones bajas de la sierra, Canto característico y zonas demarcadas de presencia que el colibr con su territorialidad mantiene otras especies alejadas. Puede encontrarse también en zonas altas.

Mapa distribución Magdalena



Comun

0 - 2300 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Chlorostilbon russatus *Esmeralda cobriza*

Familia: Trochilidae

UICN: **LC**

Dieta: Nectarivoro

Habitat: Bordes de bosque montano

Coppery Emerald


Descripción

Longitud: macho entre 8 y 8,5 cm; hembra entre 7 y 7,5 cm. Peso de 3,2 a 3,6 g. Es una especie muy distintiva, reconocible con facilidad frente a sus congéneres por el intenso brillo cobrizo que presentan las coberteras alares y caudales en ambos sexos. Las partes inferiores son de un brillante tono verde dorado. La cola es ligeramente ahorquillada y presenta una coloración cobriza con reflejos dorados. La frente, la corona y las coberteras supracaudales exhiben tonalidades verde cobrizo. Las partes inferiores son de color gris ahumado, con matices verdosos en los flancos. La cola, también ligeramente ahorquillada, es verde cobrizo; todas las rectrices, excepto el par central, presentan una banda subterminal de color púrpura cobrizo y terminan en una punta pálida.

Comentarios de Observadores

“En el Magdalena presenta migraciones altitudinales estacionales, que permiten encontrarlo desde zonas bajas hasta los 1500 o 2300 metros, donde es mas frecuente, asociado como otras esmeraldas a la temporada de floración de varias especies y especialmente a las flores de Hyacinthoides.

Mapa distribución Magdalena



Escaso

300 - 2300 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Coeligena phalerata Inca coliblanco

Familia: Trochilidae

UICN: **NT**

Dieta: Nectarivoro

Habitat: Bordes de bosque humedo

White-tailed Starfrontlet

Frecuente

1800-3200 M.S.N.M

Descripción

14 cm. El macho tiene el pico largo, recto y negro; cabeza y corona verde turquesa brillante, mancha postocular blanca; partes superiores verde oscuro metálico; partes inferiores verde esmeralda con mancha azul en la garganta, característica cola blanca. La hembra tiene el pico más largo que el macho, partes superiores verde brillante, corona verde azulado oscuro, pequeña mancha postocular blanca; partes inferiores canela rufo uniforme

Comentarios de Observadores

“Los machos prefieren las pequeñas aberturas dentro del bosque, mientras que las hembras prefieren los bordes del bosque. En su zona de distribución se distingue del otro colibri de cola blanca (Lafresnaya), por su mayor tamaño, su coloración característica en la cabeza y tamaño del pico.

Mapa distribución Magdalena



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Phaethornis anthophilus Ermitaño gorgirrayado

Familia: Trochilidae

UICN: **LC**

Dieta: Nectarivoro

Habitat: Bosque seco

Stripe-throated Hermit

Frecuente

0 - 1500 M.S.N.M


Descripción

Ermitaño mediano (13–14 cm) con pico largo y fuertemente decurvado. Plumaje general pardo oliváceo apagado. Presenta línea superciliar clara tenue y garganta grisácea. Cola relativamente larga con plumas centrales extendidas y puntas claras visibles en vuelo. Los individuos inmaduros se asemejan a las hembras adultas, aunque se distinguen por los márgenes de color bayo presentes en las plumas de la cabeza. Frecuentan los bosques más secos mucho más a menudo que otros ermitaños de Colombia y Venezuela. En su mayoría son de color gris apagado por debajo, pero ambos sexos tienen una mancha ocular negra resaltada por una línea superciliar de color blanco leonado por encima y una región blanca por debajo.

Comentarios de Observadores

“Es un ermitaño de tierras bajas, pero en el Magdalena alcanza tierras medias y bordes de bosque montaños, presente en bosques secos, humedales y manglares, siempre en áreas de heliconias, rubiaces de grandes floras y bromeláceas.

Mapa distribución Magdalena



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Ramphomicron dorsale Colibrí Piquicorto Dorsinegro

Familia: Trochilidae

UICN: **NT**

Dieta: Nectarivoro

Habitat: Paramo



Black-backed Thornbill

Descripción

Colibrí pequeño de zonas altas (8–9 cm). pico muy corto, ligeramente decurvado y negro; partes superiores aterciopeladas de negro, gorguera verde oliva, resto de las partes inferiores gris oscuro mezclado con rufo y con discos verdes; cola moderadamente larga, profundamente bifurcada, negra violácea. hembra verde hierba brillante por encima, coberteras supracaudales como en el macho; blanco leonado por debajo con algunos discos verdes; cola similar a la del macho pero más corta, con los pares exteriores de rectrices con punta blanca.

Comentarios de Observadores

“Circunscrito a las zonas altas, es un colibrí realmente entre raro y escaso incluso en su zona de distribución, de pequeño tamaño se distingue por su corto pico, liba flores pequeñas y en algunos casos lo hemos visto alimentandose de la savia de diversos arboles incluso eucaliptos introducidos.”

Mapa distribución Magdalena



Raro

2500-4200 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento


Pharomachrus fulgidus Quetzal coliblanco

Familia: Trogonidae

UICN: **LC**

Dieta: Frugivoro

Habitat: Bosque montano alto



White-tipped Quetzal

Descripción

Es el unico quetzal en el departamento, Presenta la cabeza, dorso, rabadilla, pecho, coberteras supracaudales y coberteras alares de un brillante verde iridiscente, con reflejos bronceados que se acentúan especialmente en la cabeza, la garganta y las coberteras supracaudales. La frente exhibe una pequeña cresta formada por plumas de tonalidad rojiza. El abdomen y la región inferior de las coberteras supracaudales son de color escarlata intenso a rojo bermellón. Las primarias, secundarias, terciarias y las grandes coberteras alares son negras. La cola es negra, con los tres pares externos de rectrices adornados por puntas blanco grisáceas .

Comentarios de Observadores

“Se mueve y se escucha su característico canto en la zona media y el dosel de los arboles, bastante vocal, se escucha desde la distancia y por su tamaño puede localizarse facilmente.”

Mapa distribución Magdalena



Frecuente

900 - 2500 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Hypnelus ruficollis

Bobito pecho de tigre

Familia: Bucconidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque seco

Russet-throated Puffbird

Comun

0 - 1200 M.S.N.M


Descripción

El bobito pecho de tigre es un ave de tamaño mediano y aspecto compacto, con dorso predominantemente marrón y partes inferiores beige. Presenta iris amarillentos y un pico grueso de color negro. Tiene una distintiva mancha blanca en las mejillas que se extiende hacia atrás en forma de franja blanca hasta la nuca, y una banda pectoral negra característica. Se encuentra en todas las zonas bajas del departamento desde Manglar a zonas arbustivas medias a grandes.

Comentarios de Observadores

"Le dicen Bobito por su comportamiento muy tranquilo, Practicamente posa para la foto, una vez localizado permanece en su percha y mantiene su posición fácil de observar, y su canto característico tambien lo hace fácil de ubicar."

Mapa distribución Magdalena



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Nonnula frontalis

Monjita frentigrís

Familia: Bucconidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Tierras bajas de sabana

Gray-cheeked Nunlet

Raro

0 - 1200 M.S.N.M

Descripción

Buco pequeño (17 cm) de apariencia compacta y pico robusto. Presenta frente clara característica contrastando con corona oscura. Dorso pardo oliváceo; garganta clara; pecho con leve tinte ante. Cola corta. Como otros bucos Permanece inmóvil largos periodos en estratos bajos. Compartido con Panama. Suele encontrarse en los niveles más bajos de los bosques húmedos, incluidos los parches ribereños, los de segundo crecimiento y los matorrales, y se ha registrado hasta al menos 1.000 m.

Comentarios de Observadores

"En el Magdalena solo tenemos unos pocos registros al sur del departamento en la zona de Nueva granada con evidencias adicionales donde se tiene una evidencia de anidamiento de la especie."

Mapa distribución Magdalena



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Notharchus pectoralis

Buco pechiblanco

Familia: *Bucconidae*

UICN: **LC**

Dieta: *Insectívoro*

Habitat: *Bosques húmedos*

Black-breasted Puffbird

Escaso

0 - 1000 M.S.N.M


Descripción

El Bobo Pechinegro es una especie relativamente grande dentro de la familia *Bucconidae*, caracterizada por un plumaje compuesto exclusivamente por tonos blancos y negros. Coexiste con (*N. tectus*), una especie de menor tamaño. Aunque ambas presentan una coloración predominantemente blanca y negra, *pectoralis* se distingue por su banda pectoral negra más ancha, la presencia de blanco en la nuca y la parte posterior del cuello, así como por su pico considerablemente más robusto. Por el contrario, *N. tectus* exhibe una banda pectoral más estrecha, escaso blanco en el dorso y un pico más pequeño.

Comentarios de Observadores

"Los registros en el Magdalena son en su mayoría de la zona de Manglar al lado del río Magdalena, Lo compartimos con Panamá y algunos registros al norte de Ecuador.

Mapa distribución Magdalena



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Nystalus radiatus

Buco Barreteado

Familia: *Bucconidae*

UICN: **LC**

Dieta: *Insectívoro*

Habitat: *Tierras bajas de sabana*

Barred Puffbird

Raro

0 - 900 M.S.N.M

Descripción

Buco mediano (18–20 cm) de aspecto compacto y pico robusto. Presenta corona parda con estriado oscuro fino; superciliar clara tenue; garganta blanquecina; pecho con moteado oscuro fino. Dorso pardo cálido con apariencia escamada. Cola relativamente corta, manto superior negro roto por manchas rufo, que gradúan a castaño oscuro en las partes superiores traseras y las alas con bandas negras estrechas; Lo compartimos con Panamá y Ecuador

Comentarios de Observadores

"Múltiples registros en el Magdalena, en la zona de litoral desde el Parque Tayrona hasta la vía parque Isla de Salamanca y en el sur del departamento, pero sin evidencias adicionales de fotografía o grabaciones, mas común hacia la zona de Bolívar,

Mapa distribución Magdalena



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Picumnus cinnamomeus Carpinterito Castaño

Familia: Picidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosques secos espinosos

Chestnut Piculet

Descripción

Carpinterito pequeño (9 cm) de tamaño diminuto y cola corta. Dorso canela uniforme característico; partes inferiores más claras con barrado fino. Macho con punteado blanco en la corona, tiene la frente, los lores y los penachos nasales de color crema pálido, las plumas de la corona con la punta amarilla, las de la nuca con la punta blanca; el resto del plumaje del cuerpo es de rufo intenso a marrón óxido, la rabadilla y el vientre son un poco más pálidos; La hembra carece de amarillo en la corona, las manchas blancas se limitan a la corona posterior y a la nuca. Pico corto y recto.

Comentarios de Observadores

"Amplia gama de hábitats, bosque caducifolio, terreno abierto con árboles dispersos, bosque seco y matorrales áridos y semiáridos; también manglares, bosques de litoral, favorece especialmente los bosques espinosos. Se mueve activamente en las ramas medias que frecuenta."

Mapa distribución Magdalena



Frecuente

0 - 200

M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Forpus spengeli Cotorrita Aliturquesa

Familia: Psittacidae

UICN: **LC**

Dieta: Frugívoro

Habitat: Tierras bajas semiáridas

Turquoise-winged Parrotlet

Descripción

12-13 cm. Lorito principalmente verde, cuya coloración es mucho más pálida que F. xanthopterygius. En comparación con F. xanthopterygius, esta especie tiene el dorso y la rabadilla de color azul turquesa, el macho tiene azul violáceo en el ala, mientras Las hembras carecen de azul y son completamente verdes. Hasta hace poco, esta especie se agrupaba con Riparian Parrotlet (Forpus crassirostris) y Cobalt-rumped Parrotlet (F. xanthopterygius) como lorito aliazul.

Comentarios de Observadores

"A medida que pasa el tiempo y se aprende a diferenciar, aumentan los registros de su distribución en el departamento. Esta presente en todas las zonas bajas secas y semiáridas del departamento, comparte habitat con F. xanthopterygius"

Mapa distribución Magdalena



Raro

0 - 800

M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos

Familia: Psittacidae

UICN:

LC

Dieta: Frugivoro

Habitat: Bosques secos espinosos

Spectacled Parrotlet

Descripción

Mide entre 12 y 13 cm de longitud y pesa de 24 a 28 g. El macho presenta la frente, la cara y la garganta de color verde hierba brillante, mientras que el dorso, las alas y la cola exhiben un tono verde más apagado. Destaca una intensa coloración azul en la parte baja de la espalda, la rabadilla y las plumas secundarias, complementada por un azul más claro en los hombros y las coberteras alares mayores. Muestra una tonalidad azul alrededor y detrás de los ojos. Las partes inferiores son de un verde plateado uniforme. La hembra carece completamente de las tonalidades azules y presenta un plumaje verde amarillento en las partes inferiores.

Comentarios de Observadores

"Presente en todas las zonas bajas del departamento, es muy sociable siempre en grupos hasta de 100 individuos. Muy vocal cuando está activo y en movimiento para alimentarse. abandona el dormitorio comunal a primera hora de la mañana y se detecta por su canto volando.

Mapa distribución Magdalena



Frecuente

0 - 200

M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Pyhrrura viridicata Cotorrita de Santa Marta

Familia: Psittacidae

UICN:

EN

Dieta: Frugivoro

Habitat: Bosque Montano alto

Santa Marta Parakeet


Descripción

Cotorrita pequeña (22-24 cm) de la Sierra Nevada de Santa Marta. Presenta plumaje predominantemente verde, con el pecho y los flancos finamente escamados de grisáceo. La cabeza es verde oscura, contrastando con un conspicuo anillo ocular blanquecino. La cola es larga y puntiaguda, mostrando tonos rojizos en la cara inferior, visibles especialmente en vuelo. Las alas presentan sutiles matices azulados en las primarias y secundarias, mientras que los hombros y la espalda mantienen una coloración verde brillante. El pico es gris claro y las patas grisáceas. Ambos sexos son similares en apariencia, juveniles mas apagados.

Comentarios de Observadores

"Circunscrita a las partes altas de la Sierra nevada, la población de la zona de San lorenzo ha disminuido, y son menores los registros y el tamaño de las bandadas, Esta presente en la zona de Palmor, y San pedro, siempre conexas a la palma de cera.

Mapa distribución Magdalena



Escaso

1800 - 3400

M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Drymophila hellmayri Tiluchí de Santa Marta

Familia: *Thamnophilidae*

UICN: **NT**

Dieta: *Insectívoro*

Habitat: *Arbustos y chusques de zonas medias*

Santa Marta Antbird


Descripción

Es un tiluchí de cola relativamente larga y marcado patrón de estriado, con una longitud aproximada de 15 cm y un peso entre 11 y 13 g. Las cuatro especies derivadas del complejo de *Drymophila* presentan una apariencia muy similar entre sí. En términos generales exhibe la cabeza y la nuca gris pizarra, contrastando con una garganta blanca y una amplia ceja blanquecina. El dorso es pardo oliváceo, mientras que las alas muestran tonos castaños con finas barras oscuras. El pecho y los flancos presentan un característico patrón estriado en blanco y negro, más evidente en los costados. Los juveniles muestran un estriado menos definido y una coloración general más parduzca.

Comentarios de Observadores

En zonas de chusques y matorrales, de las zonas medias de la sierra nevada, se mueve mayoritariamente en los estratos bajos y medios de la vegetación. Su canto fácilmente identificable permite ubicarlo y esperarlo mientras se desplaza y es posible registrarlo.

Mapa distribución Magdalena



Frecuente

1800 --2300 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Thamnophilus melanonotus Batará dorsinegro

Familia: *Thamnophilidae*

UICN: **LC**

Dieta: *Insectívoro*

Habitat: *Bosques secundarios y Matorrales bajos*

Black-backed Antshrike


Descripción

Hormiguero mediano (15 cm) con marcado dimorfismo sexual. El macho presenta plumaje predominantemente negro, contrastando con un distintivo parche blanco en el dorso y escapulares. Las alas son negras con conspicuas barras blancas, y la cola relativamente larga, muestra puntas claras en las rectrices externas. La hembra es de color pardo rufo, más clara en las partes inferiores, con fino barrado oscuro en las alas y la cola. Ambos sexos poseen iris oscuro, pico negro y patas grisáceas. Frecuenta bordes de bosque, matorrales densos, bosques secundarios y áreas con abundante sotobosque, donde suele desplazarse discretamente entre la vegetación baja en busca de insectos.

Comentarios de Observadores

Es un hormiguero discreto, pero que una vez se escucha o se ve es inconfundible en la zona en donde habita, se mueve tanto en los estratos medios y altos vocalizando frecuentemente y mantiene su territorio regularmente, haciéndolo fácil de ubicar.

Mapa distribución Magdalena



Frecuente

0-1800 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Thamnophilus multistriatus Batará estriado

Familia: *Thamnophilidae*

UICN: **LC**

Dieta: *Insectívoro*

Habitat: *Sotobosque a zonas intervenidas*

Bar-crested Antshrike

Descripción

El macho presenta un patrón conspicuo de barras blancas y negras que cubre prácticamente todo el plumaje, incluida la corona. La única excepción corresponde a la región comprendida entre la nuca y la garganta, donde las plumas muestran un diseño estriado. La hembra difiere notablemente del macho, exhibiendo la corona, el dorso, las alas y la cola de color rufo, con la corona ligeramente más oscura que el resto de las partes superiores. Una estrecha banda blanquecina finamente estriada de negro separa la corona del dorso. Los lados de la cabeza y la garganta muestran un patrón de estrías blancas y negras, mientras que las partes inferiores están barradas de blanco y negro, adquiriendo una tonalidad rufo-parduzca en los flancos posteriores.

Comentarios de Observadores

Solo unos pocos registros en el Magdalena en la zona sur, Guamal y Santa Ana, por lo pronto sin evidencia adicional. Normalmente se registran de 900 mts en adelante, pero por la cercanía con el Périja, podría ser posible.

Mapa distribución Magdalena



Raro

900 - 2500 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Thamnophilus nigriceps Batará cabecinegro

Familia: *Thamnophilidae*

UICN: **LC**

Dieta: *Insectívoro*

Habitat: *Bosques inundables de tierras bajas*

Black-backed Antshrike

Descripción

Es un ave que se ve casi uniformemente negra en los machos, pero posee los flancos gris oscuro y las coberteras inferiores del ala y los bordes de las plumas de vuelo inferiores blancos, condiciones que varían con la luz y entre individuos, posados lucen completamente negros y se aprecian las variaciones cuando vuela. Mientras que las hembras tienen un plumaje más característico, siendo de color pardo rufo por encima, con la cabeza negruzca hasta el pecho marcada con estrías en el eje de color blanco leonado y las partes inferiores posteriores de color leonado.

Comentarios de Observadores

Vive en bosque inundables de tierras bajas, y en los claros cubiertos de maleza de los bosques húmedos siempreverdes por debajo de los 600 m, a veces se desplaza por el suelo, y suele percharse en una rama baja moviendo la cola y vocalizando.

Mapa distribución Magdalena



Escaso

0-600 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Grallaria bangsi Tororoi de Santa Marta

Familia: Grallariidae

UICN: **VU**

Dieta: Insectivoro

Habitat: Sotobosque a zonas intervenidas

Santa Marta Antpitta

Frecuente

1600 - 3000 M.S.N.M

Descripción

La Grallaria bangsi comparte con otras especies del género su silueta característica de cuerpo robusto, cola muy corta y patas largas y fuertes, aunque presenta una apariencia ligeramente más estilizada que algunos de sus congéneres. Los individuos adultos muestran en general una coloración pardo canela en las partes superiores, con la cabeza y el dorso de tonos relativamente uniformes. La garganta es naranja, contrastando con el pecho y los flancos de tonalidad ocrácea a pardo canela, donde puede apreciarse un fino patrón escamado o moteado oscuro, particularmente en la región pectoral. El vientre es más claro, mientras que los lados de la cabeza presentan tonos parduzcos discretos. El iris es oscuro, el pico negruzco con la base más clara y las patas son grisáceas o rosadas. Ambos sexos tienen similar apariencia.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Facil de oír y registrar es complicada de ver, cuando no es en un comedero. Para mejorar las probabilidades ingresar al bosque en las areas donde se oye y esperar cuando pasa sobre los troncos caidos o el chusque en un area despejada.



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Grallaria spatiator Tororoi de la Sierra Nevada

Familia: Grallariidae

UICN: **DD**

Dieta: Insectivoro

Habitat: Bosque Nublado Alto

Sierra Nevada Antpitta

Escaso

2200 - 2900 M.S.N.M

Descripción

La Grallaria spatiator es de tamaño mediano, con una longitud aproximada de 13,2 cm, considerada la única especie del género en la Sierra Nevada de Santa Marta que carece de estrías o moteado conspicuo en el plumaje. Los adultos, similares entre sí, presentan la silueta característica de las grallarias, con cuerpo robusto, patas largas y postura erguida, aunque poseen el pico y los tarsos relativamente más finos que la mayoría de sus congéneres. Las partes superiores son de color pardo oliváceo uniforme, con un ligero matiz rufo en las alas y la cola. La garganta y las partes inferiores muestran una tonalidad ocrácea a canela

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Muy asociada al chusque de las partes altas de la Sierra, es parecida a G.ferruginepectus, pero es mas grande y patilarga, difícil de ver por donde habita, a veces puede pararse en una rama expuesta a cantar, con su trino largo y descendente caracteristico.



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Scytalopus latebricola Tapaculo ratona

Familia: Rhinocryptidae

UICN: **NT**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Sotobosque denso alto


Brown-rumped Tapaculo

Descripción

Tapaculo pequeño (10-11 cm), de apariencia compacta, cola muy corta y comportamiento extremadamente discreto. Presenta un plumaje predominantemente gris oscuro, ligeramente más pálido en la garganta y el pecho, con los flancos y la región ventral posterior de color pardorrojizo finamente barrado. El pico es delgado y negruzco, mientras que las patas son relativamente largas y de tonalidad gris rosada. Ambos sexos son similares en apariencia y los juveniles exhiben una coloración más parduza y un barrado más evidente en las partes inferiores. Se desplaza caminando o realizando pequeños saltos entre la hojarasca y la densa vegetación del sotobosque, donde rara vez se deja observar. Su presencia suele detectarse por su potente y distintiva vocalización, observaciones directas.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Como todos los tapaculos es muy difícil de ver, abrir una "Ventana" en las zonas de chusque donde suele vivir es la forma más probable de verlo, su canto característico se registra sin problema en toda la zona donde vive.



Escaso

2000 - 3800 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Scytalopus sanctamartae Tapaculo de Santa Marta

Familia: Rhinocryptidae

UICN: **NT**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque Nublado Alto


Santa Marta Tapaculo

Descripción

Mide aproximadamente 11 cm de longitud. Es un tapaculo de coloración relativamente pálida, caracterizado por una pequeña mancha blanca en el centro de la corona, flancos finamente barrados de pardo y una cola corta. Pico delgado y negruzco, adaptado para forrajear entre la hojarasca del sotobosque. El macho presenta la corona y las partes superiores de color gris medio, con una conspicua mancha blanca en la corona que puede estar parcialmente rodeada por tonos pardos en la nuca. La rabadilla es de color leonado con fino barrado negro, mientras que las coberteras supracaudales muestran un barrado menos marcado.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Como todos los tapaculos es muy difícil de ver, suele estar cerca a los cursos pequeños de agua, y cruza de un lado a otro donde puede observarse, sin embargo es fácil de registrar por ser muy vocal y es el único tapaculo a esa elevación en la sierra.



Escaso

1000 - 1700 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Cinclodes albidiventris *Cinclodes ventriblanco*

Familia: Furnariidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Arroyos y humedales altos


Chestnut-winged Cinclodes

Descripción

Ave mediana (20–22 cm) de hábitos predominantemente terrestres, característica de los ambientes abiertos de alta montaña. Presenta dorso pardo oscuro a pardo oliváceo, garganta blanquecina y vientre blanco o blanco grisáceo, rasgo diagnóstico que le da su nombre. Las alas exhiben un conspicuo parche rufo en las primarias, visible principalmente durante el vuelo. La cola es relativamente larga, de color oscuro con las rectrices externas de bordes blanquecinos, que resaltan al abrirla. El pico es ligeramente largo, delgado y levemente curvado hacia abajo, adaptado para explorar grietas, suelos pedregosos y vegetación baja en busca de invertebrados. Las patas son robustas y oscuras, adecuadas para desplazarse caminando entre rocas, pajonales y turberas.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Aun hay discusiones sobre la sistemática de su clasificación, fue separado en tres especies y el grupo que comprende la sierra nevada aparece como Subsp. oreobates, aunque se parece bastante a los del andes del sur. Su canto característico es único en su área.



Escaso

2500-4500 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce, valora y conserva la biodiversidad del departamento

Clibanornis rufipectus Hojarasquero de Santa Marta

Familia: Furnariidae

UICN: **VU**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Sotobosque denso del bosque primario

Santa Marta Foliage-gleaner

Descripción

Tamaño: aproximadamente 18–20 cm de longitud, cuerpo alargado, cola larga y graduada, postura generalmente baja y horizontal mientras se desplaza entre la vegetación. Cabeza pardo grisácea con leve superciliar poco conspicuo; rostro relativamente uniforme, pico grueso mediano y en punta de color gris oscuro al igual que sus patas. No hay dimorfismo sexual y cuando canta o está excitado levanta las plumas de la coronilla.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Se mantiene entre las melastomataceas que abundan en su habitat, y se deja ver cruzando áreas abiertas y posándose a media altura entre las ramas. Tiene un canto característico frecuente y constante en las primeras horas.



Frecuente

600 - 2000 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Cranioleuca hellmayri *Colaespina de Santa Marta*

Familia: Furnariidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectivoro

Habitat: Arroyos y humedales altos

Streak-capped Spinetail

Descripción

Mide entre 14 y 15 cm y pesa de 14 a 16 g. Presenta un superciliar angosto de tono blanquecino que contrasta con el resto de la cara, de apariencia pardusca oscura con matices beige. La corona es castaño rojiza con finas estrías negruzcas; hacia la parte posterior del cuello se torna pardo olivácea y se continúa con el dorso, las alas y la cola de color pardo rufo. La garganta es blanquecina, mientras que el pecho y el vientre son de color crema a ocráceo pálido, con los flancos y la región infracaudal teñidos de canela. El pico es relativamente largo, fino y ligeramente decurvado, de color negruzco con la base de la mandíbula inferior más clara. El iris es marrón oscuro y las patas grisáceas. Ambos sexos son similares en apariencia, y los juveniles presentan una coloración más apagada y un patrón estriado menos definido en la corona.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Con bastantes registros en la zona noroeste del perija Venezolano, cambio su clasificación a casi endemica, se mueve entre la línea media y el dosel de los arboles rítmicamente buscando en hojas y cortezas como otros hojarasqueros.



Frecuente

1520-3000 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Synallaxis candei *Cola espina bigotudo*

Familia: Furnariidae

UICN: **VU**

Dieta: Insectivoro

Habitat: Matorrales secos, bosques espinosos

White-whiskered Spinetail

Descripción

Espinero pequeño (14-15 cm) con cola larga y marcadamente graduada. Presenta un plumaje predominantemente naranja, cabeza con corona gris y la garganta es negra con una bigotera muy blanca, vientre blanco a crema pálido; los flancos muestran un ligero tinte canela. Las alas presentan bordes rufos discretos, mientras que la cola, larga y escalonada, es de color pardo rufo y suele mantenerse erguida durante el desplazamiento. El pico es delgado, ligeramente curvado y negruzco, con la base de la mandíbula inferior más clara; más cálidos y un patrón facial menos contrastado.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Forrajea desde el piso hasta los 2 metros en zonas de bosque seco a semiarido, distribuido por todo el litoral del departamento y algunas zonas del sur, allí donde el ecosistema reúne las características que prefiera para habitar, es inconfundible por su bigotera blanca y su movimiento en la floresta baja.



Frecuente

0 - 300 M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Synallaxis fusciorufa

Colaespina rufocastaña

Familia: Furnariidae

UICN: **NT**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque montano siempreverde

Rusty-backed Spinetail

Comun

2200 - 3500 M.S.N.M




OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

Descripción

Espinero pequeño (15–16 cm) de coloración general rufa oscura bastante uniforme. Presenta la garganta ligeramente más clara y una cola larga y graduada, característica del género. El pico es fino, recto y de color oscuro; el iris es marrón oscuro y las patas grisáceas. Ambos sexos son similares. Habita el sotobosque denso de bosques montanos húmedos de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde suele permanecer oculto entre enredaderas, bambúes y vegetación espesa. Se identifica por su aspecto compacto, la coloración rufo uniforme y su comportamiento discreto, desplazándose a baja altura entre la vegetación mientras emite vocalizaciones fuertes y repetitivas

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Vocal con canto característico en su zona, se mueve entre los chamizos y el sotobosque activamente sin exponerse, su observación se limita muchas veces a partes de su cuerpo entre las ramas, o un vuelo rápido cuando cambia de percha. Quedarse quieto es una muy buena estrategia para observarlo



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Thripadectes flammulatus

Trepamusgos flamulado

Familia: Furnariidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque montano siempreverde

Flammulated Treehunter

Escaso

2200 - 3500 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

Descripción

Trepador de sotobosque mediano (18–19 cm) con cola rígida relativamente larga. Presenta dorso pardo oscuro con estriado fino; garganta clara; pecho con patrón listado oscuro característico. Pico robusto, relativamente largo y ligeramente decurvado, adaptado para explorar troncos, ramas cubiertas de musgo y epifitas. Las alas y la cola son de color rufo intenso, rasgo distintivo que resulta especialmente evidente durante el vuelo. El vientre es ocráceo a canela, contrastando con el pecho densamente estriado; el iris es marrón oscuro y las patas grisáceas. Ambos sexos son similares en apariencia, mientras que los juveniles presentan un estriado menos marcado y una coloración general más apagada.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Vocal con canto característico en su zona, se mueve entre los chamizos y el sotobosque activamente sin exponerse, su observación se limita muchas veces a partes de su cuerpo entre las ramas, o un vuelo rápido cuando cambia de percha. Quedarse quieto es una muy buena estrategia para observarlo



CASI ENDEMICO

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Aphanotriccus audax *Atrapamoscas piconegro*

Familia: Tyrannidae

UICN: **NT**

Dieta: Insectivoro

Habitat: Matorrales y bosques espinosos

Black-billed Flycatcher

Raro

0 - 300

M.S.N.M

Descripción

Longitud aproximada de 13,2 cm. Tiránido de constitución delgada y estilizada, que recuerda a las especies del género Empidonax; sin embargo, se distingue por la forma del pico, la coloración de la región supraloral y su postura característica al posarse, estar muy pendiente de su canto, por que puede confundirse con otros tiranidos.

Comentarios de Observadores

Conocido de registros históricos en el parque Tayrona, tiene varios años sin aparecer, es posible que se escape a la correcta identificación por parte de los observadores, y al desconocimiento de su canto que es característico.

Mapa distribución Magdalena



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Inezia tenuirostris *Tiranuelo picodelgado*

Familia: Tyrannidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectivoro

Habitat: Bosque seco

Slender-billed Tyrannulet

Comun

0 - 300

M.S.N.M

Descripción

Tiránido pequeño (10–11 cm) de apariencia discreta. Presenta dorso oliva grisáceo; garganta clara; vientre blanquecino con leve tinte amarillento. Pico fino y relativamente largo para su tamaño. Superciliar tenue pero visible. Frecuenta matorrales secos, postura horizontal y puede confundirse en su área con hemitricus y otros tyrannidos pequeños, de los matorrales áridos, los bosques de matorral seco y los bordes de los manglares.

Comentarios de Observadores

El ave suele buscar alimento en las ramas exteriores de los arbustos, donde resulta bastante llamativa cuando se desplaza con la cola ladeada o revolotea para recoger insectos de la parte inferior del follaje

Mapa distribución Magdalena



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Myiotheretes pernix Atrapamoscas de Santa Marta

Familia: Tyrannidae

UICN: **EN**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bordes de bosque Montano, Laderas con Maleza

Santa Marta Bush-Tyrant

Descripción

Mosquero mediano (18 a 21 cm) Presenta dorso gris oscuro, garganta clara estriada y pecho gris rufo con estriado fino. franja supraloral Posee un pico robusto, característico del género. las alas son más oscuras, con dos barras alares de color canela pálido o rufo, bordes rufos de las plumas de vuelo internas; cola negruzca, banda externa de la rectriz externa ferruginosa o marrón rufo; partes inferiores rufo intenso,

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Suele posarse en ramas expuestas para capturar insectos mediante vuelos cortos. le gustan los barrancos que estan cubiertos por arboles medianos desde donde sale a cazar,



Escaso

2000 - 3000 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Myiarchus panamensis Atrapamoscas de Panamá

Familia: Tyrannidae

UICN: **NT**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Matorrales y bosques espinosos

Panama Flycatcher

Descripción

Mosquero mediano (18-20 cm) de aspecto robusto, con cresta poco conspicua y pico fuerte. Presenta dorso pardo oliváceo, garganta gris clara y vientre amarillo pálido. Cola rufo brillante con bordes oscuros visibles en vuelo. Alas con dos barras alares claras y márgenes rufos en las rémiges, rasgos que resaltan cuando el ave se desplaza entre el follaje. El pecho es grisáceo y contrasta gradualmente con el abdomen amarillo azufrado; el iris es marrón oscuro, el pico negro con la base de la mandíbula inferior más clara y las patas gris negruzcas. Habita bosques secos tropicales, manglares, matorrales, bordes de bosque y vegetación secundaria de tierras bajas.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Se distingue de otros Myiarchus presentes en el Caribe colombiano por su combinación de garganta gris, vientre amarillo claro, cola intensamente rufa y su preferencia por ambientes secos y costeros. y por su canto característico.



Frecuente

0 - 600 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Oncostoma olivaceum Picochato oliváceo

Familia: Tyrannidae

UICN: **LC**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque tropical húmedo

Southern Bentbill

Frecuente

0 - 1000 M.S.N.M

Descripción

Tiránido pequeño (10–11 cm) con pico notablemente ancho y aplanado. Presenta dorso oliva uniforme, garganta clara y vientre amarillento pálido. Superciliar tenue y cola corta. Muy activo en los estratos medios del bosque seco y húmedo. Frecuentemente sigue bandadas mixtas, desplazándose con rapidez entre el follaje en busca de pequeños insectos, que captura mediante cortos vuelos desde perchas. Su comportamiento inquieto y su distintivo pico ancho facilitan su identificación, aunque suele pasar desapercibido por su pequeño tamaño y plumaje discreto.

Comentarios de Observadores

Su pico inconfundible lo distingue de los otros tyránidos pequeños en la zona que habita, se mueve en el bosque perchándose sobre todo en la zona media, su coloración verde oliva también es un buen factor para su identificación.

Mapa distribución Magdalena



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Schiffornis stenorrhyncha Schiffornis piquidelgado

Familia: Tityridae

UICN: **LC**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque Húmedo Montano.

Russet-winged Schiffornis

Escaso

0 - 1500

M.S.N.M

Descripción

Ave mediana (18 cm) de aspecto discreto, con plumaje general pardo oliváceo uniforme. Presenta garganta ligeramente más clara y vientre grisáceo. Pico relativamente fino para el tamaño del cuerpo. Habita el sotobosque de bosques húmedos montanos, generalmente entre la vegetación densa y sombría, donde permanece inmóvil durante largos periodos. Se alimenta principalmente de insectos y pequeños frutos, que captura entre el follaje o cerca del suelo. Su vocalización, potente y melodiosa, suele ser la mejor característica para detectarla, ya que es una especie reservada y difícil de observar directamente.

Comentarios de Observadores

Es una especie de densidad baja, cuyos registros en el Magdalena vienen del Parque Tayrona y la zona cercana a Minca, zonas donde se pajarea activamente, es posible que este en otras zonas donde aun no se ha detectado. busca alimento a 1-2 m del suelo, y suele ser solitaria. El claro canto silbado se oye mucho más a menudo de lo que se ve.

Mapa distribución Magdalena



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Pheugopedius fasciatoventris
Cucarachero ventriblanco listado



 *Familia: Troglodytidae*

 UICN: **LC**

 **Dieta:** Insettivoro

 *Habitat: Bosque tropical húmedo*

Black-bellied Wren

Escaso

0 - 1500 M.S.N.M

 **OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA**
NUESTRAS AVES ENDÉMICAS 

Descripción

CASI ENDEMICO

Cucarachero mediano (15 cm) de estructura robusta y cola relativamente larga. Presenta dorso pardo rojizo, superciliar blanca conspicua y máscara oscura marcada. Garganta clara contrastante con pecho y vientre fuertemente barrados en negro y blanco, rasgo diagnóstico de la especie. Habita el sotobosque y los bordes de bosques húmedos, matorrales densos y vegetación secundaria, donde se desplaza ágilmente entre enredaderas y ramas bajas en busca de insectos y otros pequeños invertebrados.

Comentarios de Observadores

Mapa distribucion Magdalena

Es una especie más frecuente de detectar por su potente y variado canto que por observación directa, ya que suele permanecer oculta entre la vegetación. Comparte su habitat con *T. leucotis*, pero es menos frecuente.



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Troglodytes monticola
Cucarachero montano



 Familia: Troglodytidae



UICN: **CR**

 **Dieta:** Insetivoro



Habifarm Biosquegloridy de Montano

Mountain Wren

Escaso

3200 - 4800 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDÉMICAS

Descripción

ENDEMICO

Cucarachero pequeño (11 cm) de coloración general pardo oscuro con barrado fino en alas y cola. Presenta superciliar clara tenue y garganta ligeramente más pálida los flancos son blanco ante con evidentes barras pardo oscuras, la cloaca es blanca con barras negruzcas. Cola corta frecuentemente levantada. Frecuenta sotobosque húmedo, bordes de bosque montano. El juvenil es similar al adulto, pero con las puntas de las plumas oscuras en el dorso y las partes inferiores.

Comentarios de Observadores

Mapa distribucion Magdalena

Sus pocos registros son mayormente debidos al acceso restringido a su zona de vida, los altos paramos de la Sierra Nevada, se alimenta desde el piso a niveles medios, y tambien recorre muchas de las afloraciones rocosas de la zona donde forrajea en grietas. Habita dentro del parque Sierra nevada, pero esta muy amenazado por la perdida de habitat.



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Henicorhina anachoreta *Cucarachero anacoreta*

Familia: Troglodytidae

UICN:



Dieta: Insectívoro

Hermit Wood-Wren

Descripción

Considerada hasta hace poco una de las subespecies de *H. leucophrys* que viven en la sierra, recientemente fue reconocida como especie debido a que anacoreta tiene una coloración más clara y pálida en los flancos presenta un peso corporal inferior, alas más cortas y un pico de menores dimensiones. Aunque hay cierto grado de variación en ambas especies, lo que si es característico y diferenciado para ambas es su canto y la distribución altitudinal, realmente anacoreta solo está presente en elevaciones superiores A diferencia de bangsi que se encuentra en las zonas bajas de la Sierra. Poco se traslapan, por lo que su diferenciación altitudinal ayudada por su canto característico son la clave de identificación

Moviéndose entre los arbustos muy cerca al piso, en ocasiones se hace difícil de ver, pero acostumbra a asomar a medida que se desplaza dejándose observar puntualmente. Casi siempre en parejas y muy territorial en sus zonas de distribución.



1800 - 3600

M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Myioborus flavivertex *Candelita coroniamarilla*

Familia: Parulidae

UICN:



Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque montañoso y húmedos

Yellow-crowned Redstart

Descripción

Reinita mediana (12-13 cm) muy distintiva. Presenta corona amarilla brillante que contrasta con una máscara facial negra. Dorso gris oscuro; ; pecho y vientre amarillo intenso. Cola relativamente larga con manchas blancas externas visibles en vuelo y durante los movimientos de forrajeo. Habita los bosques montañosos y bosques nublados de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se desplaza activamente por el sotobosque y los estratos medios en busca de insectos. Con frecuencia abre y agita la cola para exponer las manchas blancas, comportamiento característico del género, mientras captura presas entre el follaje.

Comentarios de Observadores

Se mueve entre las hojas a nivel del dosel y debajo del mismo en los arboles, participa en las bandadas mixtas y vocaliza frecuentemente, a los 2000 mts puede traslaparse con mineatus que también está en la Sierra, a más altura predomina él.



Mapa distribución Magdalena



Comun

2000 - 3000



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Myiothlypis basilica

Reinita de Santa Marta



Familia: Parulidae

UICN: **NT**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Bosque Montano rodiales de Bambu

Santa Marta Warbler

Descripción

Reinita mediana (13 cm) con dorso verde oliva brillante y partes inferiores amarillas intensas. Presenta máscara facial oscura con superciliar blanca bien definida. Garganta amarilla continua con el pecho. Pico fino. Frecuenta el sotobosque húmedo de bosques montañosos y bosques nublados, donde se desplaza activamente entre arbustos, helechos y vegetación densa en busca de pequeños insectos y otros artrópodos. Suele observarse sola, en parejas o integrando bandadas mixtas, moviéndose de forma inquieta entre el follaje. Es una especie característica de las zonas altas de la Sierra Nevada de Santa Marta, generalmente por encima de los 1.800 m. s. n. m.

Comentarios de Observadores

Acostumbra a moverse en las zonas con presencia de chusque delgado, donde vocaliza muy frecuentemente pero pocas veces se expone, en ocasiones participa en los grupos mixtos, y allí se expone en árboles más altos, siempre se mueve en grupos de hasta 10 individuos vocalizando entre ellos para desplazarse en conjunto.

Mapa distribución Magdalena



Frecuente

3200 - 4800 M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDÉMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Myiothlypis conspicillata

Reinita de anteojos



Familia: Parulidae

UICN: **NT**

Dieta: Insectívoro

Habitat: Sotobosque Bosque montano

White-lored Warbler

Descripción

Vive más bajo que la anterior y se diferencia por una cabeza gris marcada con manchas coroneles amarillas, o una línea completa, zona supraloral blanca y lores negros. dorso verde oliva uniforme y partes inferiores amarillas. Presenta anillo ocular blanco conspicuo diagnóstico, acompañado de superciliar clara tenue. Está considerada Casi Amenazada por la Lista Roja de la UICN debido a la deforestación en curso para la conversión agrícola dentro de su área de distribución.

Comentarios de Observadores

Grupos de 2 a 3 individuos buscando alimento a poca altura sobre el suelo, vocaliza activamente todo el año con una corta serie de notas muy agudas emitidas rápidamente, que dura menos de cinco segundos y se repite a intervalos regulares.

Mapa distribución Magdalena



Comun

750 - 2200

M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDÉMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Molothrus armenti Tordo ojo rojo



Familia: Icteridae

UICN: **NT**

Dieta: Semillero

Habitat: Vegetación costera, uvitos y trupillos

Bronze-brown Cowbird

Descripción

Admitido como especie en el World bird list, este tordo separado de aeneus, ha estado en discusión de su taxonomía desde hace años. Ictérico mediano (18–20 cm), endémico de la región Caribe de Colombia. El macho presenta plumaje negro brillante con fuerte iridiscencia azul violácea y púrpura, mientras que la hembra es pardo oscura, más opaca y ligeramente estriada en las partes inferiores. Posee ojos rojos pico corto, grueso y cónico, y cola relativamente corta. Se diferencia de aeneus por su menor tamaño, el brillo más azulado y violáceo del plumaje del macho, la ausencia del intenso tono bronce característico de *M. aeneus*, y por presentar un pico proporcionalmente más corto y robusto.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Se encuentra únicamente en la región costera caribeña de Colombia, en los departamentos de Magdalena y Bolívar. Su hábitat natural son los bosques húmedos tropicales hasta los 100 metros de altitud, especie gregaria sus registros en el Magdalena están mayormente en el margen del río Magdalena frente a Barranquilla. En el vía parque Isla de Salamanca



Frecuente

0 - 100

M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Arremon basilicus Gorrión-montés de la Sierra Nevada



Familia: Passerellidae

UICN: **NT**

Dieta: Semillero

Habitat: Sotobosque Bosque montano

Sierra Nevada Brushfinch

Descripción

Ave de aproximadamente 19 cm de longitud, perteneciente a la familia Passerellidae. Presenta cuerpo robusto, cabeza relativamente grande y pico alargado y fuerte. El frente y la cara son de color negro, mientras que la coronilla muestra una franja gris con bandas negras. El dorso es verde oliváceo, las alas y la cola son pardas con tonos oliváceos, y las partes inferiores son grisáceas, tornándose más claras hacia el vientre. Habita el sotobosque de bosques secos y húmedos, bordes de bosque y vegetación secundaria densa, muy discreto debido a sus hábitos discretos y terrestres.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Buscar principalmente cerca del suelo. Se alimenta de semillas, frutos pequeños e insectos, que busca entre la hojarasca y la vegetación baja. Generalmente se observa solo o en parejas y suele detectarse por su canto fuerte y repetitivo más que por observación directa,



Comun

750 - 2800

M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Arremon schlegeli Cerquero Alidorado



Familia: Passerellidae

UICN: **LC**

Dieta: Semillero

Habitat: Bosque seco caducifolio

Golden-winged Sparrow

Descripción

Ave de tamaño mediano (17–18 cm), robusta y de cola mediana. Presenta un pico amarillo fuerte con el culmen más oscuro. La cabeza, la barbilla y los espolones pectorales que se extienden desde las auriculares son de color negro. El dorso es verde oliváceo, las alas y la cola son pardas con tonos oliváceos, mientras que la garganta, el pecho y el vientre son gris claro, aclarándose hacia las partes inferiores. Habita el sotobosque y los bordes de bosques secos y húmedos, así como vegetación secundaria densa y matorrales en las estribaciones y zonas montanas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Se alimenta principalmente de semillas, frutos pequeños e insectos, que busca entre la hojarasca y la vegetación baja. Generalmente se observa en grupos pequeños y suele detectarse por su canto de una sola nota metálica que repite permanentemente. Si te le adelantas podrás observarlos cuando pasen enfrente alimentándose.



Frecuente

0 - 1400

M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDÉMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Atlapetes melanocephalus Atlapetes de Santa Marta



Familia: Passerellidae

UICN: **LC**

Dieta: Semillero

Habitat: Sotobosque Bosque montano

Santa Marta Brushfinch

Descripción

Ave mediana (18–19 cm) de cuerpo robusto y pico grueso terminado en punta característico del género Atlapetes. No presenta dimorfismo sexual evidente. La cabeza es predominantemente negra, con un parche gris plateado sobre la mejilla característico. El dorso y la cola son grises el pecho amarillo y las patas grises. Habita el sotobosque de bosques montanos y bosques nublados de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se desplaza desde el suelo hasta el dosel, participa activamente en los grupos mixtos.

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Se pueden observar moviéndose activamente por todos los sustratos, incluso saliendo a los pastizales y la carretera, muy tranquilos y muchas veces indicadores de grupos mixtos en la zona. Llega frecuentemente a los comederos.



Comun

600 - 2800

M.S.N.M

OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDÉMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Anisognathus melanogenys *Tangara montañera de Santa Marta*

Familia: Thraupidae

UICN: **LC**

Dieta: Frugivoro

Habitat: Bosque humedo montaña

Black-cheeked Mountain Tanager

Descripción

Amplia mancha negra en las mejillas, mientras que las partes superiores y la corona son azules, hay una pequeña "lágrima" amarilla inmediatamente debajo del ojo y prácticamente todas las partes inferiores son de color amarillo a amarillo anaranjado. partes superiores azul grisáceo oscuro apagado, cola oscura, teñida y ribeteada de azul oscuro; coberteras menores y medianas de las alas superiores de color azul apagado, plumas de vuelo y terciarias de color apagado, con bordes oscuros azul verdoso; garganta y partes inferiores enteras hasta las coberteras infracaudales de color amarillo dorado, normalmente con pequeñas manchas negras visibles en los flancos y costados

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Se mueve entre la vegetación por sobre el medio de los arboles, buscando los frutos de los cuales se alimenta, es una de las 2 tangaras amarillas en la zona, pero es inconfundible por la "lágrima" amarilla detras del ojo, es mas frecuente que su compañera la D.carrikeri, tiene un canto corto comoun tic o chirp corto y rapido, totalmente diferente al de carrikeri.



Frecuente

1500 - 3200

M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Dubusia carrikeri *Tangara Montañera de Carriker*

Familia: Thraupidae

UICN: **NT**

Dieta: Frugivora

Habitat: Sotobosque montano

Carriker's Mountain Tanager

Descripción

La cabeza presenta un patrón marcadamente contrastante: los lados de la cabeza y del cuello, junto con el centro de la coronilla, la nuca, los lores y la parte anterior de la frente, incluyendo la región de los orificios nasales, son de un negro profundo. En contraste, la porción frontal de la coronilla y una ancha franja estriada que se proyecta hacia ambos lados de la nuca exhiben un tono azul celeste pálido. El dorso, las escapulares, la rabadilla, las coberteras supracaudales y las barbas externas de las plumas secundarias y primarias muestran un intenso azul pizarra. La cola es de color negro opaco, con las rectrices teñidas de azul

Comentarios de Observadores Mapa distribución Magdalena

Es menos abundante que A.melanogenys de la cual se distingue por su menor tamaño, y la falta de la lagrima amarilla post ocular. Tiene un canto largo y agudo muy diferente que la caracteriza y sirve para ubicarla, se mueve en altitudes superiores tambien



Escaso

2200 - 3400

M.S.N.M



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Ramphocelus dimidiatus Asoma terciopelo

- Familia: *Thraupidae*
- UICN: **LC**
- Dieta: *Frugivoro*
- Habitat: *Bosque humedo montaña*

Crimson-backed Tanager

Comun

0 - 1500

M.S.N.M

Descripción

Tangara mediana (18 cm) muy conspicua. El macho presenta cabeza, garganta, pecho y vientre de color rojo escarlata intenso, que contrastan marcadamente con el dorso, las alas y la cola negros; la rabadilla es rojo brillante y el pico es robusto, de tonalidad plateada azulada. La hembra es considerablemente más apagada, con plumaje pardo rojizo uniforme, vientre algo más claro y rabadilla ligeramente rojiza. Ambos sexos poseen patas oscuras y un iris oscuro. Frecuenta bordes de bosque, bosques secundarios, matorrales, áreas intervenidas, cultivos, jardines y vegetación ribereña, donde suele observarse en parejas o pequeños grupos alimentándose de frutos e insectos.

Comentarios de Observadores

Se mueve entre la vegetación por sobre el medio de los arboles, buscando los frutos de los cuales se alimenta, es una de las 2 tangaras amarillas en la zona, pero es inconfundible por la "lagrima" amarilla detras del ojo, es mas frecuente que su compañera la D.carrikeri, tiene un canto corto comun tic o chirp corto y rapido, totalmente diferente al de carrikeri.

Mapa distribucion Magdalena



AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

Conoce valora y conserva la biodiversidad del departamento

Conirostrum rufum Conirrostro Rufo

- Familia: *Thraupidae*
- UICN: **NT**
- Dieta: *Insectivoro*
- Habitat: *Subparamo*

Rufous-browed Conebill

Escaso

2600 - 3300

M.S.N.M

Descripción

Ave pequeña, de aproximadamente 13 cm de longitud y 11 g de peso, caracterizada por su plumaje oscuro y el marcado tono rufo de la cara y las partes inferiores. Presenta un pico corto, fino y puntiagudo. La corona, el dorso y la rabadilla son principalmente gris plomizo, con ligeros matices parduzcos en la cabeza y el manto. La frente, la ceja, los lados de la cabeza y el cuello muestran tonalidades entre ocre canela y rufo castaño, más intensas en la frente y la ceja y más apagadas hacia los lados de la cara; los lores y la franja postocular son notablemente más oscuros. Las alas son oscuras, con rémiges y terciarias negruzcas; estas últimas presentan bordes estrechos blanquecinos o ante pálido.

Comentarios de Observadores

Un ave que en el Magdalena solo es conocida a grandes alturas en la zona de subparamo, busca comida y se expone en la parte alta de los arbustos y arboles altos, canto repetitivo que puede sonar similar a algunos Spinus (siskin),

Mapa distribucion Magdalena



OBSERVA, RESPETA Y CONSERVA
NUESTRAS AVES ENDEMICAS

AVES ENDEMICAS Y CASI ENDEMICAS DEL MAGDALENA

NOTA ORNITOLOGICA

Descripción

Variación coloración del pico



Dentro del marco de las salidas de campo que se realizaron en los diferentes hábitats en el Magdalena, los autores encontraron una variación para el color de los picos en el caso de la especie Arremon schlegli como pueden ustedes observar en la foto, algunos individuos presentan una coloración negruzca que no ha sido escrito en la literatura y que podría corresponder; a un estado de madurez o bien a una variación que se está dando dentro de la población que tenemos aquí en el departamento. Se hace necesarios mayores estudios para determinar la causa de esta variación y poder reportarla adecuadamente en un artículo científico posterior.



La Fundación Ornitológica Sierra Nevada (FOSIN) es una organización no gubernamental ambiental, con sede en Santa Marta (Colombia), creada en 2001 con el propósito de promover la conservación de las aves y de los ecosistemas que conforman la Sierra Nevada de Santa Marta y la región Caribe colombiana.

A lo largo de su trayectoria ha ampliado su campo de acción, integrando la investigación científica, la educación ambiental, la restauración ecológica, el manejo de fauna silvestre y el desarrollo del aviturismo como herramientas para la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de las comunidades locales.

La fundación desarrolla proyectos orientados a la protección de especies y hábitats estratégicos, la restauración de ecosistemas degradados mediante la producción de árboles nativos, la capacitación de observadores y guías de aves, la gestión y administración de centros de atención y valoración de fauna silvestre, así como estudios ambientales y programas de monitoreo de biodiversidad. De igual manera, participa activamente en iniciativas de investigación y monitoreo ornitológico, aportando información científica que contribuye al conocimiento y la conservación de la avifauna colombiana.

FOSIN promueve un modelo de conservación que integra la participación comunitaria, el turismo de naturaleza y la restauración ecológica, buscando generar beneficios ambientales, sociales y económicos para las poblaciones locales. Su experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y otros ecosistemas del Caribe colombiano la ha consolidado como una organización de referencia en el desarrollo de proyectos de conservación, educación ambiental y uso sostenible de la biodiversidad.



GUÍA ACTUALIZADA DE LAS

AVES ENDÉMICAS Y CASI ENDÉMICAS

DEL MAGDALENA



CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA

